

Nu är det dags för ditt barn att få vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta

Vaccination är en trygghet för alla

Genom allmän vaccination har Sverige utmärkta möjligheter att på ett enkelt sätt hindra barn och vuxna att insjukna i vanliga barnsjukdomar. Sjukdomar som var och en på sitt sätt kan orsaka allvarliga komplikationer och besvär.

Insjuknandet i difteri och stelkramp har nu nästan upphört helt i Sverige eftersom minst 90 % av alla barn har vaccinerats. Det är dock viktigt att ta förnyelsedos eftersom det hela tiden är risk för ny smitta.

Ytterligare en vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta

Inom barnhälsovården fick ditt barn sannolikt vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta. Vaccinationerna måste dock upprepas för att ett fullgott skydd ska bibehållas. Eleverna i årskurs 8 erbjuds därför vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta.

Difteri är en svår svalgssjukdom som kan orsaka kvävningssdöd hos barn. Dessutom producerar difteribakterien ett gift som allvarligt kan skada hjärta, njurar och nervsystem.

Stelkramp (tetanus) orsakas av ett gift som produceras av en bakterie som ligger vilande i jord och som kan finnas i avföring från djur och människor. Man kan smittas vid t.ex. en sårskada som blivit nedsmutsad av jord. Sjukdomen är livshotande med svåra kramper som kan leda till andningsförlamning. Antibiotika hjälper inte.

Kikhosta (pertussis) är en smittsam bakteriesjukdom med långvarig, attackvis hosta, kikningar och kräkningar. Spädbarn kan få allvarliga andningsproblem, viktminskning och olika komplikationer. I Sverige har man på senare tid sett en ökad förekomst av kikhosta hos skolbarn.

Kan vaccinationen ge besvär?

Vaccinationen ges i överarmen och kan ge rodnad och i vissa fall en svullnad och ömhet på injektionsstället, feber kan förekomma. Detta är inte farligt utan visar att kroppen reagerar på och bearbetar vaccinet och brukar gå över på någon dag.

När ska man skjuta upp vaccinationen?

Man undviker att vaccinera barn med akuta infektionssjukdomar med feber eller tydligt nedsatt allmäntillstånd. Det är dock inget hinder att vaccinera om barnet har en lättare infektion som en vanlig förkylning. Det är heller inget som hindrar att man vaccinerar barn med eksem eller astma. Barn som fått vaccination mot tuberkulos eller gula febern, bör inte vaccineras förrän efter cirka en månad.

Har barnet redan haft kikhosta?

Även om ditt barn har haft kikhosta är det viktigt att vaccinera. Immuniteten avtar nämligen succesivt och för att bibehålla skyddet är det viktigt att ”fylla på”.

Hur länge varar skyddet efter denna vaccination?

Enligt vad man nu vet så varar skyddet mellan 10-20 år. Ditt barn kan komma att behöva upprepa dosen vid behov senare i livet

Vid frågor kontakta skolsköterskan.