

Nu är det dags för ditt barn att få vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund

Alla barn i Sverige erbjuds gratis vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund. Vaccinerna mot alla tre sjukdomarna ges i samma spruta. Det kombinerade vaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund ger troligen ett livslångt skydd mot alla sjukdomarna.

Vaccinering sker vid två tillfällen. Den första erhålls på barnavårdscentralen, när barnet är 1 ½ år. Den andra ges i skolan vid 6-8 års ålder. Mässling, påssjuka och röda hund kommer sannolikt att kunna utrotas i Sverige om minst 90 % av alla barn vaccineras.

Fr.o.m. 1 januari 2013 registreras alla givna vaccinationer i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, i ett nationellt vaccinationsregister.

Varför vaccinerar man mot dessa sjukdomar?

Mässling är en besvärlig sjukdom med hög feber, hosta och långvarig trötthet. I enstaka fall tillstötter hjärninflammation, som kan ge bestående skador.

Påssjuka är den allvarligaste orsaken till hjärnhinneinflammation hos barn. Den kan ge bestående skador. Pojkar som insjuknar i påssjuka efter puberteten kan få testikelinflammation, som kan vara mycket smärtsam och dessutom orsaka sterilitet.

Röda hund kan ge allvarliga fosterskador om gravida kvinnor blir smittade. Genom att vaccinera alla barn – även pojkar – kan vi förhindra att gravida blir smittade med röda hund.

Kan vaccinationen ge besvär?

Feber och utslag kan uppträda en till två veckor efter vaccinering. Några enstaka barn kan få lindrig ledvärk eller svullnad, som vid påssjuka. Alla dessa besvär är snabbt övergående och brukar försvinna efter ett par dagar. Barnen är inte smittsamma för andra.

Barn med feber ska inte vaccineras.

En vanlig förkylning utan feber är inget hinder för vaccination. Barn som fått vaccination mot tuberkulos eller gula febern bör inte vaccineras förrän efter viss tid förflutit. Gammaglobulin bör inte ges inom 3-4 veckor efter vaccination med Priorix. Om gammaglobulin redan givits bör man vänta tre månader innan vaccination med Priorix ges.

Har eleven haft en eller flera av de tre sjukdomar?

Det kombinerade vaccinet bör ges till barn som har haft, eller som man tror har haft, någon eller flera av sjukdomarna. Detta därför att röda-hund-diagnosen ofta är felaktig, vilket även kan vara fallet med diagnos av mässling och påssjuka. Barn som tidigare vaccinerats mot någon av dessa sjukdomar, bör få det kombinerade vaccinet. Sverige har en utomordentlig möjlighet att på ett enkelt sätt förhindra och utrota tre vanliga barnsjukdomar, som var och en på sitt sätt kan orsaka allvarliga komplikationer och besvär. Vi är redan på god väg då sjukdomarna nu är sällsynta.

Den som är ovaccinerad riskerar att drabbas av sjukdomarna som vuxen, vilket ofta innebär att man får ett svårare sjukdomsförlopp.

Vid frågor kontakta skolsköterskan